



• نام تجاری CHAMPIX (CHANTIX در آمریکا)

• نام ژنریک: Varenicline Tartrate

• گروه دارویی: ترک سیگار

• اشکال دارویی:

قرص های سفید رنگ 0/5 میلی گرمی و آبی رنگ 1 میلی گرمی

• مورد مصرف و روش تجویز:

خط اول درمانی جهت ترک سیگار در افراد بالای 18 سال

روش مصرف

روز 1 تا 3	قرص 0/5 میلی گرم 1 بار در روز
روز 4 تا 7	قرص 0/5 میلی گرم 2 بار در روز
روز 8 تا پایان هفته 12	قرص 1 میلی گرم 2 بار در روز

به طور معمول ترک سیگار در روز هشتم درمان می باشد ولی گاهی هم به شکل جایگزین می توان بین روزهای 8 تا 35 صورت گیرد. امکان دارد یک دوره ی 12 هفته ای اضافی هم برای موفقیت آمیزتر بودن درمان توسط پزشک تجویز گردد.

• مکانیسم اثر :

چمپیکس یک آگونیست نسبی گیرنده های نورونی نیکوتینی $\alpha 4\beta 2$ بوده که سبب ترشح دوپامین و در نتیجه کاهش عوارض ناشی از ترک سیگار می گردد. از طرف دیگر با مسدود کردن این گیرنده ها، آنتاگونیست آنها نیز محسوب شده و تمایل فرد به کشیدن سیگار را کاهش می دهد.

• موارد منع مصرف:

حساسیت به دارو

واکنش‌های شدید پوستی

• عوارض جانبی:

شایع‌ترین عارضه جانبی چمپیکس حالت تهوع می‌باشد. از دیگر عوارض آن می‌توان به کابوس‌های غیر معمول شبانه، یبوست، نفخ شکم و استفراغ اشاره کرد.

• تداخلات دارویی:

تداخلات دارویی معنی داری با وارنیکلین شناسایی نشده است.

مصرف همزمان سایمتیدین و وارنیکلین باعث افزایش سطح خونی وارنیکلین می‌گردد. لذا در بیماران مبتلا به نارسایی حاد کلیوی که هر دو دارو را استفاده می‌کنند، تعدیل دوز وارنیکلین نیاز است.

از آنجایی که مصرف همزمان دارو با الکل باعث افزایش اثرات الکل می‌گردد، توصیه می‌شود در دوره‌ی درمان، میزان مصرف الکل کاهش یابد .

• نکات و توصیه‌های مهم:

• در بیماران با نارسایی حاد کلیوی تعدیل دوز مصرفی مورد نیاز است.

• در بیماران با سابقه‌ی تشنج و یا در مواردی که باعث کاهش آستانه‌ی تشنج می‌شوند با احتیاط مصرف گردد.

• در طول دوره‌ی درمان، در رانندگی و کار با ماشین آلات احتیاط شود.

• در صورت بروز یا بدتر شدن علائم بیماری‌های قلبی-عروقی به پزشک اطلاع داده شود.

• توصیه می‌شود در صورت بروز خلق افسرده، پرخاشگری، تغییر رفتار، افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی در بیمار دارو قطع گردیده و به اطلاع پزشک برسد. پیشنهاد می‌شود قبل از شروع درمان کلیه سوابق مربوطه‌ی بیمار ارزیابی شود و در طی دوره درمان نیز از نظر تغییرات خلقی و رفتاری کنترل گردد.

• ایمنی و اثر بخشی چمپیکس در مصرف همزمان با سایر داروهایی که برای ترک سیگار استفاده می‌گردند مطالعه نشده است. گرچه مصرف همزمان با برچسب‌های نیکوتینی، می‌تواند منجر به افزایش عوارض و قطع درمان گردد.

• مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

• در دوران حاملگی در گروه C می‌باشد.

• از آنجایی که دارو در شیر مادر ترشح می‌شود مصرف آن در دوره‌ی شیردهی باید با صلاحدید پزشک انجام گردد.

• شرایط نگهداری:

• دارو را می توان در حرارت معمولی اتاق (20 تا 25 درجه سانتی گراد) نگهداری نمود.

• بسته بندی دارو:

✓ بسته شروع درمان:

• شامل یک بلیستر 11 عددی از قرص 0/5 میلی گرمی و یک بلیستر 14 عددی از قرص 1 میلی گرمی

✓ بسته ادامه درمان:

• حاوی بلیسترهای 28 یا 56 عددی قرص 1 میلی گرمی

