

# colofac®

## نام تجاری

Colofac®

## نام ژنریک

Mebeverine

## دسته دارویی

آنتی اسپاسمودیک

## اشکال دارویی

Capsule 200 mg (Retard) , Coated tablet 135 mg

## مکانیسم اثر

mebeverine یک آنتی اسپاسمودیک موسکولوتروپیک است که مستقیماً بر روی سلول‌های عضلات صاف دستگاه گوارش اثر گذاشته و اسپاسم را بر طرف می‌کند، بدون آن که حرکت طبیعی آن را تحت تأثیر قرار داده و باعث هیپوتونی گردد.

## فارماکوکینتیک

mebeverine به سرعت از روده‌ها جذب می‌شود. در داخل بدن هیدرولیزه شده و وراتریک اسید و الکل بلورین ایجاد می‌کند. هر دو این‌ها داخل ادرار ترشح شده و دفع می‌گردد.

## موارد و مقدار مصرف

برای درمان علائم سندرم روده تحریک پذیر (IBS) و موارد مشابه دیگر همچون: کولون تحریک پذیر مزمن، یبوست اسپاستیک، کولیت مخاطی، کولیت اسپاستیک.

علاوه بر این، Colofac® در درمان علائم این موارد نیز کاربرد دارد: کرامپ و دردهای کولیکی شکمی، اسهال غیر اختصاصی و نفخ

Tablet 135 mg: سه بار در روز و ۲۰ دقیقه قبل از هر وعده غذا مصرف شود.

Capsule 200 mg (Retard): دو بار در روز مصرف شود.

## عوارض جانبی

عارضه‌ی شایعی وجود ندارد. در موارد نادری راش پوستی و کهیر مشاهده شده است.

## تداخلات دارویی

موردی تا کنون مشاهده نشده است.

## موارد منع مصرف

حساسیت به مواد تشکیل دهنده

# colofac®

## مصرف در حاملگی و شیردهی:

مطالعات بر روی حیوان هیچ عارضه‌ی تراتوژنیک‌ی نشان نداده‌اند. با این وجود، احتیاطات لازم باید در زمان حاملگی صورت گیرد.

## شرایط نگهداری

در درمای زیر ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

