

sirolimus
Rapamune[®]
1mg and 2mg Tablets
Preserve renal function



sirolimus
Rapamune[®]
1mg and 2mg Tablets
Preserve renal function

- در زمان مصرف راپامیون و تا ۱۲ هفته پس قطع مصرف دارو، از یک روش مطمئن برای جلوگیری از بارداری استفاده کنید.
- ترشح راپامیون در شیر مادر کاملاً مشخص نشده است، پس اگر به کودک خود شیر می‌دهید، حتماً پزشک خود را از این امر آگاه سازید.

◀ **فواید مصرف دارو**

ارجحیت داروی راپامیون بر سایر داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی این است که راپامیون سبب آسیب بافت کلیه نشده و مصرف آن، تغییری در کارکرد کلیه ایجاد نمی‌کند. راپامیون نه تنها احتمال بروز سرطان را به علت مکانیسم اثر متفاوتش نسبت به سایر داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی کاهش می‌دهد بلکه طبق تحقیقات انجام شده، سبب بهبود بسیاری از موارد سرطان‌های پوستی نیز شده است.

◀ **عوارض جانبی داروی راپامیون**

همان‌طور که می‌دانیم تمامی داروها ممکن است موجب عوارض جانبی در بیماران بشوند، ولی در اکثر افراد معمولاً عوارض جانبی با شدت کم دیده می‌شود، شایعترین عوارض جانبی این دارو عبارتند از: جوش، درد پشت، یبوست یا اسهال، سرگیجه خواب‌آلودگی، سردرد، درد مفاصل اختلال خواب، ضعف و تهوع و استفراغ، در صورت بروز هرگونه علائم غیرطبیعی، با پزشک خود مشورت کنید.

◀ **داروهای دیگری که با راپامیون تداخل اثر دارند**

در صورت مصرف همزمان داروهای زیر حتماً به پزشک خود اطلاع دهید:

- آمفوترسین ب، بروموکریپتین، سایمتدین، دانازول، متوکلوپرامید، ریفامپین، داروهای درمان کننده ایدز، وراپامیل، نیکاردیپین اریترومایسین و دیلتیازم
- داروهای ضد تشنج مانند کاربامازپین، فنی توئین، فنوباریتال
- داروهای ضد قارچ مانند فلوکونازول و کتوکونازول.

این دارو فقط برای بیمار مورد نظر تجویز شده است؛ مصرف آن بدون دستور پزشک خود خودداری نموده و در هر موردی، با پزشک خود مشورت کنید.

راپامیون

◀ **اگر یک روز مصرف دارو را فراموش کردید**

به محض به خاطر آوردن، دارو را مصرف کنید، اگر نزدیک به زمان مصرف بعدی دارو بود، داروی فراموش شده را مصرف نکنید و طبق برنامه به مصرف دارو ادامه دهید، هیچوقت برای جبران مقدار داروی فراموش شده دو مقدار را با هم مصرف نکنید.

◀ **اگر به اشتباه دارو را بیش از حد توصیه شده مصرف کردید**

حتماً با پزشک خود تماس بگیرید.

◀ **داروی راپامیون را چگونه باید مصرف کرد؟**

- داروی راپامیون به صورت یکبار در روز مصرف می‌شود.
- قرص راپامیون را با یک لیوان پر از آب مصرف کنید.
- هیچگاه قرص را خرد نکنید، نجوید و یا نشکنید، بلکه آن را بطور کامل بلعید.
- در صورت مصرف همزمان باسیکلوسپورین، راپامیون را از نظر زمانی ۴ ساعت بعد از سیکلوسپورین مصرف کنید.
- راپامیون را می‌توانید با غذا و یا بدون غذا و در هر حال به یک شیوه منظم مصرف کنید.

◀ **طریقه نگهداری دارو**

- داروی راپامیون را بدور از گرما، رطوبت و نور و در درجه حرارت اتاق (بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد) نگهداری کنید.
- از نگهداری دارو در محیط حمام خودداری کرده و حتماً دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

◀ **مصرف داروی راپامیون در دوران بارداری و شیردهی خانم‌ها**

- این دارو ممکن است برای جنین مضر باشد، اگر در حین مصرف راپامیون باردار شدید، حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.



پیوند کلیه

با عمل پیوند، کلیه‌های جدید به بدن فردی که کلیه‌هایش دچار نارسایی شده و دیگر نمیتواند عمل تصفیه خون را انجام دهد، پیوند زده می‌شود.

مهمترین عارضه‌ای که ممکن است پس از پیوند کلیه جدید رخ دهد، پس زدن آن است به این معنی که سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی بدن، در مقابل بافت کلیه جدید واکنش نشان داده و آن را جزئی از بدن خود نمی‌شناسد. برای جلوگیری از این عارضه، پس از پیوند هر عضوی باید داروهایی مصرف کرد که سیستم ایمنی بدن را تضعیف کنند، تا حدی که نتواند در مقابل عضو جدید پیوند زده شده واکنش نشان دهد، یکی از این داروها راپامیون (Rapamune) نام دارد.

راپامیون به چه منظوری استفاده می‌شود؟

داروی راپامیون برای جلوگیری از رد کلیه پیوند شده استفاده میشود و می‌توان آن را همراه با داروهای دیگر مصرف کرد.

احتمال رد پیوند تا سال‌ها پس از پیوند وجود دارد، به همین علت راپامیون را باید برای مدت‌های طولانی و طبق دستور پزشک استفاده نمود و قطع خودسرانه آن ممکن است خطرناک باشد.

راپامیون به چه صورتی موجود است؟

داروی راپامیون به شکل قرص مثلثی شکل سفید و یک میلی‌گرمی در دسترس است. بسته‌بندی آن به صورت بسته‌های ۳۰ تایی است.



در هنگام مصرف راپامیون به چه نکاتی باید توجه کرد؟

راپامیون را به صورت یکبار در روز و بطور منظم مصرف کنید.



راپامیون را همراه غذا و یا بدون غذا، (همیشه همراه غذا یا همیشه با شکم خالی) و در هر حال به یک صورت منظم مصرف کنید.

از خوردن گریپ فروت یا نوشیدن آب گریپ فروت در طول مدت مصرف راپامیون خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث تشدید عوارض جانبی راپامیون شود.

در صورت مصرف همزمان راپامیون با سیکلوسپورین، راپامیون را حداقل ۴ ساعت قبل از سیکلوسپورین مصرف کنید.

راپامیون می‌تواند سبب کاهش تعداد سلول‌های خونی که وظیفه مبارزه با عفونت را بر عهده دارند شود، به همین دلیل از تماس با افرادی که مبتلا به سرماخوردگی، آنفولانزا یا سایر بیماری‌های مسری هستند خودداری کنید و در صورت بروز هرگونه عفونت مانند تب، لرز و گلودرد با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت نیاز به واکسیناسیون، حتماً با پزشک خود مشورت کنید زیرا واکسیناسیون در زمان مصرف راپامیون ممکن است ایمنی‌زایی مؤثر ایجاد نکند.

از تماس با اشعه خورشید یا اشعه UV مصنوعی (مانند سولاریوم) خودداری کنید، در هنگام قرار گرفتن در مقابل نور خورشید از ضد آفتاب و پوشش مناسب استفاده کنید.

دارو را دقیقاً به صورتی که تجویز شده مصرف کنید، پزشک شما ممکن است مقدار مصرف دارو را برای به دست آوردن بهترین نتیجه تغییر دهد پس دقیقاً طبق نظر پزشک خود عمل کنید.

افرادی که تحت درمان با راپامیون هستند باید به طور منظم توسط پزشک خود معاینه شده و از نظر کارکرد کلیه کبد، مقدار چربی و سطح راپامیون موجود در خون مرتباً چک شوند، پس حتماً به پزشک خود مراجعه کنید و آزمایشات خود را به موقع انجام دهید.



